

BARYUM SÜLFAT

Ph.Eur.%94 a/a

Disposibl Baryum Enema

397g

EZEM

Üretim yeri isim ve adresi:
E-Z-EM Inc.717 Main Street,
N.Y. 11590 ABD

Ruhsat sahibi ithal ve satış
yerinin isim ve adresi:
OPAKİM Tıbbi Ürünler
Tic. Ltd. Şti.,
Tophanelioğlu Cad.
No.76 Altunizade 81190
İstanbul

Formül: Baryum Sülfat Ph.Eur. %94 a/a.

Sorbitol, simetikon, sodyum karragenan, polioksietilen gliseril mono-oleat, gum gatti içerir.

Endikasyonları: Gastrointestinal sistemin X-ray incelemesinde kullanılmaya mahsus radyopak madde.

Kontrendikasyonları: Gastrointestinal sisteminde gerçek veya şüpheli perforasyonu veya obstrüksiyonu olan hastalarda, oral yolla alındığında, kalın barsak obstrüksiyonu vakalarında veya baryum sülfatın kontrendike olduğu vakalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/önlemler: Doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. Çocuklar, yetişkinler ve güçsüzlerde enema yoluyla kullanılırken dikkat edilmelidir. Önceden kalp hastalığı olan büyüklerde ihtiyatlı olunmalıdır. Sorbitol içerdiğinden herediter fruktoz intoleransı olan hastalarda kullanılması uygun değildir.

Yan etkiler/advers etkiler: Çoğu hastada istenmeyen etkiler görülmemiştir. Yine de kabızlık, tıkaç, peritonit ve granülomla sonuçlanan intestinal perforasyon; intravazasyon, emboli ve aspirasyon pnemonisi, EKG değişiklikleri baryumlu enema sırasında veya akabinde oluşabilir. Baryumlu enema sırasında bakteriyemi oluşabildiğinden prostetik kalp kapakçıklı hastalarda koruyucu olarak IV antibiyotik tavsiye edilir.

Gebeler ve laktasyonda kullanımı: X-ışınlarına maruz kalınması bebeğe zarar verebileceğinden hamilelikte kullanılması tavsiye edilmez. Süt veren annelerde emniyetle kullanılabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORA BAŞVURUNUZ

Kullanım şekli ve dozu: Oral veya enema kullanımı içindir. Kullanım öncesinde ürün, likit bir süspansiyon oluşturmak için suyla karıştırılır. Yetişkinler ve yaşlılarda enema olarak uygun bir süspansiyon içinde 150-750 g baryum sülfat. Oral kullanımda uygun bir süspansiyon içinde 60-450 g baryum sülfat. %20-115 a/h dansite aralığı üzerinde süspansiyon yapılabilir (%20-60 a/a). Kalın barsağın çift kontrast incelemesinde % 60-115 a/h arasında 400-700 ml süspansiyon kullanılır. Kalın barsağın tek kontrast incelemesinde %20-40 a/h arasında gerektiği kadar verilir. Doz kullanılan tekniğe ve hastanın durumuna göre değişebilir. Yaşlılar için özel dozaj tavsiyeleri yoktur. Çocuklarda doz çocuğun yaşına ve ağırlığına bağlıdır.

Karıştırma talimatı: Beyaz dişli klempü tüpe takın ve kapatın. Yandaki grafik dansite aralığını ve her dansite için ne kadar su kullanılacağını gösterir. Belirtilen miktarda ılık suyu (40C) ölçün ve kırmızı çıt-çıtılı kapaktan bunu torbaya boşaltın. Torbayı parmak deliklerinden tutun ve 10-20 sn iyice çalkalayın. Kullanmadan önce yeniden 10-20 saniye çalkalayın. Sonra baş ve işaret parmağınızla torbanın tüp bağlantısındaki kırmızı topu torbanın içine itin. Baryumu tüpden akıtın ve rektal kateteri takın.

Saklama koşulları: 25°C altında kuru bir yerde saklayınız. Ürünü sulandırdıktan sonra hemen kullanınız.

Ticari takdim şekli ve ambalaj muhtevası: Tek kullanımlık 397g/567g pvc torbada toz, rektal kateter ve tüp içeren takım

Piyasada mevcut diğer dozaj şekilleri: Yoktur

ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ

Reçete ile satılır

Kullanmadan önce çalkalayınız

Ruhsat tarih ve no : 30.04.2001 - 109/80

rev 08/01 1255973

Süspansiyon için Toz

