

E - Z - HD™

BARYUM SÜLFAT
% 98 a/a Ph. Eur.
Oral süspansiyon için toz

340 g Toz

Formül: Baryum Sülfat %98 a/a Ph.Eur.

Ayrıca, sakkarin sodyum içerir

Farmakolojik Özellikler: Baryum sülfat radyografik işlemlerde tanısal yardımcı olarak kullanılır ve farmakolojik etkinliği yoktur. Vücuttan geçerken sindirim sisteminin duvarını sıvayarak ve X-ışınlarının absorpsiyonunu artırarak etki eder

Endikasyon: Özofagus, mide ve duodenumun çift-kontrast radyografisi

Kontrendikasyonlar: Gastro-intestinal sistemin herhangi bir kısmında perforasyon veya tıkanma şüphesi olan hastalarda, gastrik çıkım bozuklukları veya baryum sülfatın kontrendike olduğu diğer durumlarda kullanılmamalıdır

Uyarılar/önlemler: Ürün sorbitol içerdiğinden herediter fruktoz intoleransı olan hastalarda kullanılması uygun değildir. Ayrıca sodyum içerdiğinden bu durum düşük sodyum diyetinde olan hastalarda göz önünde bulundurulmalıdır. Kalp hastalığı olan yaşlılarda ve akut ülseratif kolit, akut divertikül iltihabı, trakeo-özofagus fistülü durumlarında dikkatli kullanılmalıdır.

Gebeler ve laktasyonda kullanımı: X-ışınlarına maruz kalınması bebeğe zarar verebileceğinden hamilelikte kullanılması tavsiye edilmez. Süt veren annelerde emniyetle kullanılabilir.

Yan etkiler/advers etkiler: Çoğu hastada istenmeyen etkiler görülmemiştir. Bununla beraber bazı hastalarda kullanım sonrası kabızlık olmuştur. Nadirde olsa baryum sülfat intestinal obstrüksiyon veya kolon dilatasyonuna ve kardiyak aritmilere neden olabilir. Sorbitol içerdiğinden bazı hastalarda mide rahatsızlığı ve diyareye yol açabileceği bilinmelidir.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

Kullanım şekli ve dozu: Oral kullanım içindir. Kullanım öncesinde ürün, likit bir süspansiyon oluşturmak için suyla karıştırılır. X-ışını tetkikinden önce, hastaya gaz yapıcı bir ilaç verilir. Daha sonra gaz, tetkik altındaki gastro-intestinal sistem bölgesini yavaşça genişletirken hastaya %250 a/h 340g 'E-Z-HD' süspansiyon içerilir. Doz radyolog tarafından belirlenir.

Yetişkinler ve yaşlılar: Uygun bir gaz yapıcı maddenin verilmesinden sonra %250 a/h 340g 'E-Z-HD'

Çocuklar: Doz çocuğun yaşına ve ağırlığına bağlı olarak ayarlanır.

Karıştırma talimatı:

- 1- Şişeye 65 ml su ilave et
- 2- Kapağı emniyete al, şişeyi ters yüz et ve dibe yapışan tozu salıvermek için hafifçe vur.
- 3- 10-20 sn. kuvvetle çalkala
- 4- Kullanmadan önce 10-20 sn.yeniden kuvvetle çalkala
- 5- Kapağı aç. Hastaya şişeden içir.

Dikkat: Sulandırılmış ürünü hemen kullanınız. Artık ürünü kullanmayınız ve saklamayınız

Saklama Koşulları: 25°C'in altında, oda sıcaklığında kuru bir yerde saklanmalıdır. Ürün son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari takdim şekli ve ambalaj muhtevası: 340 g l ve 24 adetlik polietilen şişede

Ruhsat sahibi ithal ve satış yerinin isim ve adresi:
OPAKİM Tıbbi Ürünler Tic. Ltd. Şti., Tophanelioğlu
Cad. No.27 Altunizade 81190 İstanbul

Üretim yeri isim ve adresi: E-Z-EM Inc., 717 Main
Street, N.Y. 11590 ABD

Fiyat küpürü bulunmayan ambalajları satın almayınız.

Fiyat Küpürüdür
Opakim Ltd./E-Z-EM Inc.
E-Z-HD® 340 g polietilen şişe
Oral süspansiyon için toz
KDV Dahil Türkiye'de P.S.F. -----TL

e-Z-EM®

Prospektüs bilgileri etiket üzerindedir.

Reçete ile satılır

Ruhsat tarih ve numarası

Seri Numarası, Üretim ve S.K.T.

İlacın Çizgi Kodu